

Tecniche di integrazione

(1) Verificare che, se $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\lambda x}}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|\lambda|} (|\lambda| + 1)$$

(2) Calcolare

$$(a) \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 - 2x + 4)^2} \quad (b) \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2 - 2x + 2)}$$

Risp: (a) $\frac{1}{24} + \frac{\pi}{9\sqrt{3}}$. (b) $\frac{1}{10}(3\pi + \log 2)$.

(3) Calcolare

$$(a) \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^a(x+1)} \quad (0 < a < 1) \quad (b) \int_0^{\infty} \frac{x^{2/3}}{x^2 + 2x + 2} dx \quad (c) \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x^2 + 5x + 6)} dx$$

Risp: (a) $\frac{\pi}{\sin(a\pi)}$. (b) $\pi \sqrt[3]{2}/\sqrt{3}$. (c) $\pi(1/\sqrt{2} - 1/\sqrt{3})$.

(4) Dimostrare che, se $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha \in (-1, n-1) \setminus \mathbb{N}$ e $a > 0$, si ha

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha} dx}{(x+a)^n} = \binom{\alpha}{n-1} \frac{(-1)^n \pi a^{\alpha-n+1}}{\sin(\alpha\pi)}.$$

Il coefficiente binomiale $\binom{\alpha}{k}$, quando α non è intero, è definito come

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$$

(5) Dimostrare che

$$\int_0^{\infty} \frac{\log x}{x^2 + 2x + 2} dx = \frac{\pi}{8} \log 2.$$

☆ (6) Dimostrare che

$$\int_0^{\infty} \frac{\log x}{(x^2 + 1)^2} dx = -\frac{\pi}{4}.$$

[Sugg: integrare la funzione $f(z) = \log_+ z/(z^2 + 1)^2$, lungo il cammino chiuso

$$\gamma = [-R, -\rho] \cdot (C_{\rho}^+)^{-1} \cdot [\rho, R] \cdot C_R^+,$$

in cui C_b^+ è la semicirconferenza di raggio b e centro 0 che appartiene al semipiano superiore, percorsa in senso antiorario, vale a dire $C_b^+(t) := be^{it}$ con $t \in [0, \pi]$.

☆ (7) Dimostrare che

$$\int_0^{\infty} \frac{\log x}{\sqrt{x}(x^2 + 1)} dx = -\frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}.$$

[Sugg: usare il cammino suggerito al problema precedente].

[TI] (8) Calcolare

$$(a) \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x dx}{x^2 - 2x + 5} \quad (b) \int_0^{\infty} \frac{\sqrt[3]{x} dx}{x^2 - 2x + 4}$$

Risp: (a) $\frac{\pi}{2e^2} \sin(1)$. (b) $\frac{2\sqrt[3]{2}\pi}{3} \sin(2\pi/9)$.

13-14/E2 (9) Calcolare il seguente integrale esprimendo il risultato in termini di quantità palesemente reali.

$$\int_0^\infty \frac{x^{2/3} dx}{x^2 + 4x + 8}.$$

Risp: $\pi/\sqrt{3}$.

11-12/S1 (10) Calcolare il seguente integrale esprimendo il risultato in termini di quantità palesemente reali.

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x} dx}{x^2 + 6x + 18}$$

Risp: $\frac{\pi\sqrt[4]{2}}{\sqrt{3}} \sin(\pi/8)$.

(11) Calcolare il seguente integrale. Il risultato è un numero reale e deve essere espresso in termini di quantità palesemente reali.

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x} dx}{x^2 - 2x + 5}$$

Risp: $\frac{\pi 5^{1/4}}{2} \sin((\pi - \arctan 2)/2)$.

(12) Calcolare

$$(a) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad a \in (-1, 1) \qquad (b) \int_0^\pi \frac{dx}{(a + \cos x)^2} \quad (a > 1)$$

Risp: (a) $\frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}$. (b) $\frac{a\pi}{(a^2-1)^{3/2}}$.

(13) Dimostrare che se $n \in \mathbb{N}^*$ si ha

$$\int_0^\pi (\sin x)^{2n} dx = \frac{\pi(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}.$$

☆ (14) Dimostrare che

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \infty \qquad \lim_{K \rightarrow +\infty} \int_{-K}^K \frac{\sin x}{x} dx = \pi.$$